

## Болотная черепаха (*Emys orbicularis*)

Автор: Administrator - Обновлено 18.04.2011 15:43

---



**Описание:** Болотная черепаха имеет обширный ареал и распространена в южной, восточной и центральной Европе, на Кавказе, в Передней Азии, до западного Туркменистана и западного Казахстана на востоке и на северо-западе Африки.

На территории Северной Евразии встречается в Литве, Латвии, Белоруссии, Украине (включая Крым), Молдавии, Армении, Азербайджане, Грузии. В Казахстане распространена в Приаралье на восток до г. Кызылорда. В Туркменистане обитает в водоёмах юго-западного Копетдага, Приатречья и в озёрах западного Узбоя.

На север черепаха распространена до Литвы, северной Белоруссии, в России — до Смоленской, Брянской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской областей, верховьев Дона, в республике Марий-Эл, на средней Волге (Самарская область), в Башкирии и на левобережье Урала до Костанайской области в Казахстане. В европейской части России встречается в центральных и южных районах.

В более северных широтах также можно встретить болотную черепаху, но скорее всего она попадает туда благодаря человеку.

**Другие названия:** *Emys orbicularis*, Pond Turtle, европейская болотная черепаха.

**Подвиды:**

*Emys orbicularis capolongoi* (Sardinian Pond Turtle)

*Emys orbicularis colchica* (Colchis Pond Turtle)

## Болотная черепаха (*Emys orbicularis*)

Автор: Administrator - Обновлено 18.04.2011 15:43

---

*Emys orbicularis eiselti* (Eiselt's Pond Turtle)  
*Emys orbicularis fritzjuergenobsti* (Obst's Pond Turtle)  
*Emys orbicularis galloitalica* (Italian Pond Turtle)  
*Emys orbicularis hellenica* (Western Turkey Pond Turtle)  
*Emys orbicularis hispanica* (Spanish Pond Turtle)  
*Emys orbicularis iberica*  
*Emys orbicularis kurae* (Kura Valley Pond Turtle)  
*Emys orbicularis lanzai* (Corsican Pond Turtle)  
*Emys orbicularis luteofusca* (Central Turkey Pond Turtle)  
*Emys orbicularis occidentalis* (North African Pond Turtle)  
*Emys orbicularis orientalis* (Common European Pond Turtle)  
*Emys orbicularis persica* (Eastern Pond Turtle)

В природе черепаха обитает в тихих, мелководных водоемах (отсюда и получила название "болотная"). Предпочитает водоемы с пологими берегами, на которые можно легко выползти и погреться на солнце.

**Болотная черепаха** предвигается достаточно быстро в воде и на суше, и часто выходит на берег. Зимует черепаха болотная на дне водоема, впадая в спячку.

Размеры болотной черепахи: длина - до 20 см, ширина до 16 см. Окраска панциря варьируется от темно-черной до светло-серой. Нижняя часть панциря всегда светлее. На темном фоне разбросаны небольшие желтые пятна и черточки. Голова, шея и конечности болотной черепахи покрыты желтыми точками. У самцов хвост более длинный, пластрон у них слегка вогнут, у самок он плоский или слегка выпуклый

В аквариумы *Emys orbicularis* попадает чаще всего из природных водоемов. Важно быть осторожным, так как такие черепахи могут являться переносчиками инфекционных заболеваний.

**Содержание:** Для европейской болотной черепахи необходим аквариум с берегом от 100 л, лампа накаливания и УФ-лампа, которая предотвращает развитие рахита. Лампу необходимо брать специальную для рептилий.

## Болотная черепаха (*Emys orbicularis*)

Автор: Administrator - Обновлено 18.04.2011 15:43

---

Температура должна быть от 18 до 25 °С. При более низкой (ниже 15 градусов) температуре черепаха впадает в спячку. Более высокая температура и подмена воды стимулируют размножение.

Следует учесть, что необходимо делать стенки аквариума достаточно высокими, чтобы черепаха не могла выбраться наружу, иначе она пострадает от действий других домашних животных, либо от собственных действий - съест мелкие предметы.

Черепаха болотная - не совсем водный житель, поэтому для нее необходим островок или бережок, на который она будет вылезать погреться и подышать воздухом.

**Питание:** европейскую болотную черепаху необходимо кормить животным кормом: трубочником, мотылем, крупной дафнией, головастиками, живым и сушёным гаммарусом, насекомыми, мелкими кусочками мяса, рыбы. Особенно сильно требуется животный корм молодым черепахам. Их следует кормить обильно и ежедневно. В более старшем возрасте черепах можно кормить и растительным кормом: листьями салата, капусты, тёртой морковью, кусочками банана. Частота кормления для взрослых черепах - 2-3 раза в неделю.

**Размножение:** Половой зрелости черепахи достигают в возрасте 5-9 лет, при длине карапакса 9-12 см. (*Карапакс* (зоол., лат. carapax) — часть панциря животного, сплошной щиток, прикрывающий тело сверху. У черепах карапаксом называют спинной щит панциря.) Спаривание у болотной черепахи происходит в воде. Самка за сезон может делать до 3 кладок по 5-10 яиц в каждой. Подходящая среда для инкубации - рыхлый, слегка влажный песок температурой около 30 °С. Маленькие черепашки вылупляются примерно через 2 месяца. В аквариуме черепашки растут медленно. За год они вырастают до 4 см, через 2 года – до 5–6 см, а через 3–4 года достигают 8–10 см.