



Причиной заболевания является длительное пребывание рыб в воде бедной кислородом.

Признаки кислородного голодания:

- постоянное нахождение рыб у поверхности воды и жадное заглатывание воздуха ртом;
- рыбы плохо поедают корм,
- рыбы отстают в росте, органы размножения дегенерируют (вырождаются, их функционирование ухудшается из поколения в поколение), и рыбы теряют способность к размножению.

Особое значение приобретает количество растворимого в воде кислорода в период размножения рыб. При недостатке кислорода икра не развивается, а родившиеся личинки или мальки погибают либо остаются "затянутыми" даже при качественном и обильном кормлении.

Для предупреждения кислородного голодания и гибели рыб от асфиксии:

- в аквариуме должно быть достаточное количество растений;
- зимой световой день необходимо поддерживать в течение 10- 12 часов, летом - 15 часов;
- не следует давать рыбам лишнего корма;
- надо ежедневно удалять остатки не съеденного рыбами корма, отмершие части растений, погибшие водные организмы;
- нельзя допускать слишком уплотненной посадки рыб в аквариуме.
- надо удалять из аквариума лишние водные организмы (особенно моллюсков) при значительном их размножении;
- в воде нерестовых и выростных аквариумов, где содержат молодь рыб, не достигшую половой зрелости, количество растворимого кислорода должно быть больше, чем в аквариумах, где содержат взрослых рыб;
- желательно 1-2 раза в месяц проводить во всех аквариумах исследование воды на

Асфиксия (удушье) (Asphyxia)

Автор: Editor

05.07.2010 12:53 - Обновлено 15.07.2010 14:27

содержание в ней растворимого кислорода.

Иногда симптомы удушья совпадают с симптомами инфекционных заболеваний. Чтобы отличить болезни, пересадите рыб в воду, богатую кислородом. Если болезнь инфекционная - состояние рыб не улучшится.