

Афиоземион, или афиосемион стриатум (Aphyosemion Striatum)

Автор: Editor

16.09.2010 13:35 - Обновлено 20.02.2011 12:09



Описание: Родиной рыбки является западная и центральная Африка.

Тело вытянутое, передняя часть почти цилиндрическая и уплощается с боков к хвостовому стеблю. Лоб немного уплощен, рот верхний. Крупный спинной плавник отнесен на заднюю половину тела. Самцы красивой, многоцветной окраски, ярче самочек.

Самцы по отношению друг к другу довольно агрессивны, но в крупном аквариуме с большим количеством рыб их внимание рассредотачивается и агрессивность уменьшается.

Содержать лучше в видовом аквариуме с 1 самцом и несколькими самочками, или с другими карпозубыми, причем виды должны занимать разные слои воды.

Сверху аквариум следует накрыть, т.к. могут выпрыгнуть.

Корм - живой (предпочтительно мотыль, коретра, трубочник, энхитреус, дождевые черви), можно нежирную говядину. Рачков (дафния, циклоп) и заменители берут не все рыбы.

Условия содержания в аквариуме: dH до 15°; pH 6,5-7,0; t 18-22°С.

Размножение: Характеристика воды для разведения - dH до 8°; pH 6,5-6,8; t 22-25°С. Карбонатная жесткость минимальная.

Афиоземион, или афиосемион стриатум (Aphyosemion Striatum)

Автор: Editor

16.09.2010 13:35 - Обновлено 20.02.2011 12:09

Разведение возможно в аквариуме для содержания. Желательны уменьшение уровня воды и снижение общей и карбонатной жесткости, повышение температуры на 2-3 °С и обильное кормление.

Нерест растянут по времени, поэтому мальки выклевываются периодически. Обычно группу рыб пересаживают из одного нерестовика в другой каждые 7-10 дней. Икра клейкая. Инкубация икринок длится 15-20 дней. Стимуляцией для массового выклева мальков является добавление воды с температурой на 2-3 °С меньше.

Стартовый корм - артемия, резаный трубочник.