


Акара голубовато-пятнистая (*Aequidens pulcher*)

Автор: Editor

23.07.2010 12:01 - Обновлено 20.02.2011 12:09



Описание: Обитает в природе в медленно текущих и стоящих водах Колимбии, Панамы, Венесуэлы, о. Тринидад.

Рыбка достигает размера около 10 см.

Тело продолговато-овальной формы, сплюснутое с боков. Голова крупная с выпуклым лбом, на которой расположены большие голубые глаза и толстые губы. Спинной и анальный плавники длинные, спинной проходит от затылка и до основания хвостового плавника.

Окрас тела зависит от места происхождения рыбки (от возбуждения) и может варьироваться от серовато-коричневого до голубовато-зеленого цвета. Спинка у акары оливково-коричневая, бока с голубым блеском, грудка и брюшко бело-розовые либо желтоватые до оранжевого цвета. На чешуйках возможны штрихи красного цвета или блестящие голубовато-зеленые пятнышки, образующие прерывистые поперечные полосы. На середине тела, с каждой стороны, находится черное пятно. На голове и жаберных крышках рисунок из блестящих голубовато-зеленых либо коричневатозеленых точек и штрихов.

Самец отличается от самки удлиненным спинным плавником и более ярким окрасом.

Акара голубовато-пятнистая всеядна. Употребляет живой, сухой (гранулы, хлопья), замороженный корм и хлеб. В природе эта рыбка является микрохищником.

Условия содержания в аквариуме: Вода для содержания: dH до 15°; pH до 7,0; t 21-23 °C.

Акара голубовато-пятнистая (*Aequidens pulcher*)

Автор: Editor

23.07.2010 12:01 - Обновлено 20.02.2011 12:09

Рыбы очень неприхотливы. Предпочтительны аквариумы больших размеров. Растения должны быть с хорошей корневой системой и жесткими листьями. для крупных рыб следует декорировать аквариум камнями и корягами. Также необходимы несколько плоских камней.

Размножение: Вода для разведения: dH до 10°; pH 7,0; t 26-28 °С, аэрация.

Для размножения желательно выбрать рыбок достигших 1 года. Стимулом к нересту служит частое добавление свежей воды, усиление аэрации и повышение температуры на 2-3°С.

В нерестовой аквариуме желательно разместить камни (плоские), коряги, ямки в грунте в качестве субстрата для икры.

Во время нереста рыбки становятся очень агрессивными и тщательно защищают свою территорию.

Самка мечет от 300 до 1000 икринок. После выклева родители переносят личинок во рту в заранее приготовленные ямки в песке. Случается что первую кладку съедают родители, но в дальнейшем это прекращается.

Инкубационный период зависит от температурного режима и длится от 3 до 8 суток. Еще через 4 суток мальки начинают плавать и их можно начинать кормить живой пылью, коловратками, науплиями рачков, нематодами. Акара голубовато-пятнистые очень заботливые родители. Они постоянно ухаживают за потомством: кормят мальков, разжевывая им кусочки корма.